



# Vaksinasi Tambahan Yang Disarankan

Anak anda juga disarankan untuk mendapatkan vaksinasi tambahan bagi memberi perlindungan terhadap penyakit lain. Rujuk doktor bagi mengetahui lebih lanjut tentang vaksinasi berikut.



## Rotavirus

- Dos pertama pada umur  $\geq 6$  minggu
- 2-3 dos

## Tifoid (Vaksin polisakarida)

- Untuk umur  $>2$  tahun  $\rightarrow$  1 dos
- Dos penggalak setiap 3 tahun

*Nota: Vaksin tifoid diwajibkan kepada pengendali makanan*

## Varisela-zoster (Cacar air)

- Untuk umur 1-12 tahun  $\rightarrow$  2 dos, selang  $\geq 4$  minggu

## Taun

- Untuk umur 2-6 tahun  $\rightarrow$  3 dos utama, selang 1-6 minggu
- Untuk umur  $>6$  tahun  $\rightarrow$  2 dos utama, selang 1-6 minggu
- Dos penggalak pada umur  $>2$  tahun

## Rabies

- Sebelum pendedahan: 3 dos pada Hari ke-0, 7, 28
- Dos penggalak setiap 2-3 tahun

## Hepatitis A

- Untuk umur  $>1$  tahun  $\rightarrow$  2 dos, selang 6-12 bulan

## COVID-19

- Untuk umur  $>5$  tahun  $\rightarrow$  2 dos
- Untuk umur 6 bulan-5 tahun dengan komorbiditi/sistem imun lemah  $\rightarrow$  2 dos

## Meningococcus ACYW-135

- 1 dos
- Imuniti sehingga 3 tahun



## Influenza

- Umur minimum 6 bulan
- 1 dos setiap tahun
- Untuk kali pertama pada umur  $<9$  tahun  $\rightarrow$  2 dos, selang 4-6 minggu

